


Sertés Cirkovirus 2-es típus (PCV-2)

Az egyik legkártékonyabb betegség
amely a sertéstelepeket világszerte
érinti manapság.

A betegség (PCVD) általában összefügg:



**Növekedésben
visszamaradás:**
(csökkent növekedési
paraméterek)



Elhullás
-tól | -ig
4% | 20%



Termelési veszteségek
növedék és
hízósertésekben

ÓRIÁSI HATÁS

A betegség okozta költségeket becslése:



Között

562 és 900 millió €

közötti évente az EU-ban



Nagyon észrevehető testtömeg veszteség az érintett állatoknál

De ugyancsak előfordul:

a légzőszervi betegség
komplex (PRDC) részeként

emésztőszervi betegséggént

A bőrt és a vesét károsító
tünetegyüttes formában (PDNS)



Magas elhullási arány

Szaporítási
zavarok

Szubklinikai előfordulás (csak bizonyos fokú
növekedésbeni visszamaradás)

Fontos szempontok a cirkovirozis (PCDV) felismeréséhez:

01

A sertések
nem nőnek,
fenn tartják a
testállapotukat

03

Az érintett sertések
letargiásak, és lemarad-
nak a csoporttársaik
mögött.

05

Gyakoriak a
légzőszervi
tünetek, hasmenés,
magnagyobbodott
perifériás nyirokcsomók,
a betegség nem javul
az antibiotikum
kezelésre.

02

Nagyon eltérő
nagyságú állatok
a kutricában.

04

A malacok durva
szőrűek, sápadt bőrűek,
néha sárgaság jelen-
tezik.



**Lassú, de folyamatosan előre
haladó betegség, amely majdnem
minden telepen jelen van**

Hogyan kezelhetjük a betegséget?



**A
TÁRSFERTŐZÉSEK
KEZELÉSE**
más kórokozók
kiválthatják a
PCVD-t, ilyen a
sertés parvovírus,
(PPV) és a PRRSV.



MENEDZSMENT
a “20 pontos
Madec” alapelvek
követése.



KÖRNYEZET
A ventiláció,
a hőmérséklet és
a páratartalom
ellenőrzése.



JÁRVÁNYVÉDELEM
(a PCV-2 nagyon ellenálló
vírus): **bélsárral való
átvitel a ragályfogó
tárgyakon keresztül**
(eszközök, lábbelik, és
járművek).



VAKCINÁZÁS
konzultáljon
állatorvosával.